

Terapia Inalatoria prima e durante la COVID-19 era

Le terapie inalatorie sono comunemente usate nel trattamento dei pazienti con BPCO. Seppur l'utilizzo delle terapie inalatorie nei pazienti adulti e pediatrici, ricoverati in terapia intensiva, fosse ampiamente diffuso nelle terapie intensive italiane, durante la pandemia da COVID-19 c'è stata una maggiore preoccupazione nella somministrazione di farmaci aerosol, a causa del potenziale rischio di inquinamento ambientale.

L'obiettivo di questo evento formativo è quello di fornire ai discenti una panoramica sulle indicazioni alla terapia inalatoria nel paziente critico e sulle modalità tecniche di erogazione dei farmaci prescritti

PROGRAMMA:

Introduzione con survey on line – A. Lucchini e G. Foti (15 minuti)

Indicazioni alla terapia inalatoria nel paziente critico – G. Foti (25 minuti)

Come effettuare la terapia inalatoria nel paziente critico – A. Lucchini (25 minuti)

Discussione con risposta alle domande dei discenti – A. Lucchini e G. Foti (15 minuti)

Curriculum Vitae

Dott Alberto Lucchini - Infermiere

- Coordinatore infermieristico dell'U.O. Terapia Intensiva Generale - ASST Monza, Ospedale San Gerardo – Monza
- Coordinatore PICC team – ASST Monza

Dott Giuseppe Foti – Medico specializzato in Anestesia e rianimazione

- Direttore UOC Anestesia e Rianimazione dell'ASST-Monza Ospedale S. Gerardo
- Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza ASST-Monza Brianza
- Professore Associato di Anestesia e Rianimazione presso Università Milano Bicocca